

अनुसूची ७ : स्वास्थ्यको विभिन्न विषयमा सामाजिक व्यवहार परिवर्तनका लागि सूचकांकहरू

तालिका १.१: जिल्लास्तरका कार्यक्रम व्यवस्थापकहरूलाई कार्यक्रम अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्न आवश्यक HMIS का प्रमुख सूचकहरू

कार्यक्रम	सूचकहरू
१. खोप	१.१ % एक बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरू जसले बीसीजीको खोप लगाएको १.२ % दाढुरा र रुबेला बिरुद्ध खोप लगाएको एक बर्ष उमेरका बच्चाहरू १.३ बीसीजी, दाढुरा, DPT-HepB-Hib, Td, JE, Polio को अपव्यय दर १.४ % नियोजित खोप विलनिक (साइट) को आयोजना १.५ % खोप पछि प्रतिकूल घटनाहरू (AEFI), प्रतिजन प्रतिवेदन रिपोर्ट गरियो
२. नवशिशु	२.१ % नवजात शिशुहरू जसलाई जन्मे पछि तुरुतै आमाको नांगो छातीमा ठाँसेर राखियो २.२ % नवजात शिशुहरू जसलाई जन्मेपछि तुरुतै क्लोरहेक्साडिन मलम लगाइयो २.३ एक महिना मुनिका शिशुहरूमा सम्भावित गम्भीर जीवाणु संक्रमण (PSBI) को मृत्यु दर २.४ % नवजात शिशुहरू जसले जन्मको एक घण्टा भित्र स्तनपान सुरु गरे २.५ % नवजात शिशुहरू जसले जन्मको २४ घण्टा भित्र चेक(अप प्राप्त गरे २.६ % नवजात शिशुहरू जसले प्रोटोकल अनुसार तीन चेक(अप प्राप्त गरे (२ घण्टा भित्र, तेस्रो दिन र सातौं दिनमा) २.७ % नवजात शिशुहरू जसको कम जन्म तौल (<२.५ के.जी.)
३. श्वास प्रश्वास तथा भाडा पखाल	३.१ पाँच बर्ष भन्दा मुनिका बच्चाहरूमा पखालाको घटना दर ३.२ % पखाला लागेका पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरू जसलाई जिंक र ओआरएसको साथ उपचार गरियो ३.३ % पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरूमा एआरआई (ARI) घटना दर ३.४ % निमोनिया लागेको पाँच वर्ष मुनिका बच्चाहरू जसले एन्टिबायोटिक प्राप्त गरे
४. पोषण	४.१ % वृद्धि अनुगमनको लागि दर्ता भएका ०-१२ महिना उमेरका बच्चाहरू ४.२ वृद्धि अनुगमनको लागि दर्ता गरिएको ०-२४ महिनाका बच्चाहरूको औसत संख्या ४.३ % वृद्धि अनुगमनको लागि दर्ता गरिएको ०-२४ महिना उमेरका कम तौलका बच्चाहरू
५. मातृ स्वास्थ्य	५.१ % गर्भवती महिलाहरू जसले कम से कम एक एएनसी (ANC) चेकअप गराए ५.२ % गर्भवती महिलाहरू जसले प्रोटोकल अनुसार चार एएनसी (ANC) चेकअपहरू गराए (चौथौं, छैरौं, आठौं र नवौं महिना) ५.३ % संस्थागत सुत्क्रेरीको प्रतिशत ५.४ % स्किललड बर्थ एटेन्डेन्ड (SBA) को सहयोगमा जन्मिएका बच्चाहरू ५.५ % महिला जसले प्रसव उप्रान्त २ घण्टा भित्र पोष्ट नेटल चेकअप (PNC) प्राप्त गरे ५.६ % महिला जसले प्रसव उप्रान्त प्रोटोकल अनुसार तीन पोष्ट नेटल चेकअप (PNC) गरे (प्रसव पछि, पहिलो २४ घण्टा भित्र, दोस्रो ७२ घण्टा भित्र र तेस्रो ७ दिन भित्र)
६. परिवार नियोजन	६.१ प्रजनन उमेरका महिलाहरू (WRA) मा गर्भनिरोधक प्रसार दर (CPR) (आधुनिक विधिहरू) ६.२ प्रजनन उमेरका विवाहित महिलाहरूमा गर्भनिरोधक प्रसार दर (CPR) (आधुनिक विधिहरू) ६.३ % सुत्क्रेरी (प्रसव पछिका) महिलाहरू जसले आधुनिक परिवार योजना विधिहरू (इम्लान्ट, IUCD) को प्रयोग गरे

७. क्षयरोग	७.१ प्रति १००,००० जनसंख्यामा क्षयरोगको पहिचान दर ७.२ क्षयरोग उपचार सफलता दर
८. एच. आई. भी. र एड्स	८.१ % कन्डम प्राप्त गर्ने उच्च जोखिम समूह ८.२ % एचआईभी परीक्षण गर्ने उच्च जोखिम समूह ८.३ % उच्च जोखिम समूहहरू जसले एचआईभी परीक्षण गरे र उनीहरूको नतीजा जान्दछन् ८.४ % सिरिन्जबाट लागू पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू (PWIDs) जसले सुई र सिरिन्ज प्रोग्राम (NSP) प्राप्त गरे ८.५ % सिरिन्जबाट लागू पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू (PWIDs) जो वर्तमानमा लागू पदार्थ प्रतिस्थापन थेरापी (OST) गर्दैछन् ८.६ % यौन सम्पर्कबाट संक्रमित (STIs) को उपचार ८.७ % सिरिन्जबाट लागू पदार्थ सेवन गर्ने व्यक्तिहरू (PWIDs) जो पछिल्लो १२ महिना देखि लगातार लागू पदार्थ प्रतिस्थापन थेरापी (OST) गर्दैछन्

स्रोत: HMIS Indicators, 2070

HMIS का विभिन्न कार्यक्रमअनुसार सूचकहरू, तिनको मापन (numerator, denominator, unit of measurement) बारे विस्तृत जानकारी व्यवस्थापन महाशाखाद्वारा प्रकाशित सूचक पुस्तिका परिमार्जित HMIS, 2070 का सूचकहरूको संग्रहमा उपलब्ध छ।

तथ्यांक विश्लेषण तथा प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०७६
जिल्लास्तरका कार्यक्रम व्यवस्थापकहरूका लागि